

عدد الوفيات



16,538

عدد حالات الشفاء



1,142,039

عدد الحالات المؤكدة



1,224,992

عدد الحالات النشطة



66,361

عدد الفحوص



10,979,333


النقاط الرئيسية

1. في الأسبوع 22، أبلغت وزارة الصحة عن 27,910 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19- بمعدل بلغ 67.8 حالة/ لكل 100.000 شخص من السكان. وبلغ عدد الوفيات الجديدة المتصلة بالمرض المبلغ عنها هذا الأسبوع 187 حالة، ما يشير إلى معدل وفيات 0.7%.
2. حتى تاريخ 6 حزيران/يونيو 2021، تم إعطاء إجمالي* 596,955 جرعة لقاح في جميع أنحاء العراق، ما يشير إلى أن 2.58% من السكان المستهدفين قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.
3. أعلنت وزارة الصحة هذا الأسبوع عن وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر-بيونتيك، وأعلنت عن استكمال توزيعه على المحافظات العراقية بناء على بيانات استهلاك اللقاح والطلب الوطني عليه.
4. في الأسبوع 22، واصلت محافظتا بغداد والبصرة تسجيل أعلى مستوى إبلاغ عن المرض، فيما سجلت محافظتا الأنبار وصلاح الدين مستوى إبلاغ متوسط.
5. لا تزال العدوى المجتمعية منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد مع احتمال تفاقمها.
6. بلغ معدل إشغال أجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة 19% لكل منهما.




1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 22، (31 مايو/آيار إلى 6 يونيو/حزيران 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 27,910 حالة، ما يشير إلى انخفاض بلغ 1,232 حالة مقارنة بالأسبوع 21 حيث تم الإبلاغ عن 29,142 حالة.




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 22، 2021

- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (22) 275,722 فحصاً، ما يمثل 6,694 فحصاً لكل مليون من السكان.




الشكل 2: فحوص RT-PCR في العراق حسب الأسبوع لكل مليون - الأسبوع 22، 2021

- بلغ معدل الإيجابية في الأسبوع (22) 10%. المحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي بغداد بنسبة 13.3% وذي قار بنسبة 21.7% وميسان بنسبة 21.6%. وسجلت أدنى نسبة في أربيل 3.1% وصلاح الدين 3.8%.



الشكل 3: معدل الإيجابية لكوفيد-19 حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 22، 2021

- بلغ عدد الوفيات المتصلة بكوفيد-19- المبلغ عنها هذا الأسبوع 187 حالة وفاة، وهو ما يمثل معدل إماتة 0.7%، وهو معدل لا يختلف كثيراً عن معدل الإماتة المبلغ عنه في الأسبوع 21 (0.6%). من ناحية أخرى، سجلت محافظة بغداد أعلى معدل إماتة حالات عند 2.6%، تليها كركوك عند 2.3%، فيما سجلت البصرة وديالى المعدل الأدنى عند 0.1% لكل منها.



الشكل 4: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسبوع - الأسبوع 21، 2021

- بلغ متوسط عدد المرضى في المستشفيات في الأسبوع (22) 1597 مريضاً يومياً، مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ 1.7%. من ناحية أخرى، بلغ معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة لهذا الأسبوع 19%.
- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع ظلت على حالها، وهي الفئة العمرية الأعلى من 15-45 سنة، والفئة العمرية الأعلى من 45-65 سنة، بمعدل 57% و29% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) و(الأعلى من 65 سنة) بمعدل 38% و51% على التوالي.
- ويشير التوزيع الجنساني إلى معدل حالات إصابة 58% ومعدل وفيات 62% بين الذكور.

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 22:

خلال الأسبوع 22، انتشرت العدوى المجتمعية بشكل كبير في العراق وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية. وسجلت المستويات الأعلى في بغداد والبصرة، فيما سجلت المستويات الأدنى في نينوى والأنبار وصلاح الدين.

المحافظات	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	14	1	6	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
بابل	31	2	4	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	1	4	متوسطة
بغداد	99	6	14	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة
البصرة	137	2	13	عالية	منخفضة	شديدة	4	1	3	8	شديدة
الديوانية	46	1	16	متوسطة	منخفضة	شديدة	2	1	3	6	متوسطة
ديالى	53	1	11	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
كربلاء	68	2	15	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
كركوك	41	9	7	متوسطة	متوسطة	متوسطة	2	2	2	6	متوسطة
كردستان	67	9	6	شديدة	متوسطة	متوسطة	3	2	2	7	شديدة
ميسان	90	5	21	شديدة	منخفضة	عالية	3	1	4	8	شديدة
المثنى	30	2	11	متوسطة	منخفضة	شديدة	2	1	3	6	متوسطة
النجف	82	3	13	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
نينوى	30	3	5	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	1	4	متوسطة
صلاح الدين	29	6	4	متوسطة	متوسطة	منخفضة	2	2	1	5	متوسطة
ذي قار	48	7	22	متوسطة	متوسطة	عالية	2	2	4	8	شديدة
واسط	97	3	21	شديدة	منخفضة	عالية	3	1	4	8	شديدة
العراق	68	5	10	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة


الشكل 5: العدوى المجتمعية وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية (الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية)

3. تآهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

أ- حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى تاريخ 6 يونيو/حزيران 2021، تم إعطاء إجمالي 596,955* جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 2.58% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. ومن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح، تلقى 440,007 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 156,948 شخصاً تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.

- في الأسبوع 22، كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح أن 286,176 (86%) من الذكور قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 135,597 (32%) من الإناث. فيما تلقى 97,854 (63%) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 56,698 (37%) من الإناث. ولا يزال هناك إقبال منخفض نسبياً بين النساء وقد يكون مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 175,015 (41%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 254,973 (59%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.
- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى من اللقاح بغداد- الكرخ 83,872 (4.0%)، تليها النجف (3.0%)، والديوانية (2.5%)، وكربلاء والبصرة (2.2%)، وكركوك (2.1%). سجلت ميسان النسبة الأقل من التطعيم بين السكان في المحافظات خلال الأسبوع 22 بمعدل (0.5%)، فيما سجلت السليمانية معدل (0.9%)، وواسط ونيوى (1.1%)



الشكل 6: التطعيم اليومي باللقاح ضد كوفيد-19، الأسبوع 22، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 596,955* جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يومياً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

ب- تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



صورة 1: فريق منظمة الصحة العالمية في البصرة يزور أحد مراكز التطعيم. منظمة الصحة العالمية في العراق

- زار فريق منظمة الصحة العالمية في محافظة البصرة مستشفى الزبير العام لمناقشة جناح عزل المرضى المصابين بكوفيد-19- والثغرات المتعلقة بمعدات وحدات العناية المركزة في المرفق الصحي المذكور. كما زار الفريق مركز التطعيم ضد كوفيد-19- في المستشفى لمناقشة مدى توفر لقاح فايزر- بيونتك وطرق إعطائه وسبل دعم جهود السلطات الصحية المحلية في الدعوة لتعزيز الإقبال على اللقاح في المحافظة.

- كما عقد فريق منظمة الصحة العالمية في البصرة كذلك اجتماعاً فنياً مع دائرة صحة ذي قار لتبادل المعلومات حول فطار الغشاء المخاطي (الفطر الأسود) وأي حالات اعتلال مشترك أخرى تم الإبلاغ عنها بين مرضى كوفيد-19- في المحافظة.



صورة 2: منظمة الصحة العالمية تدعم أنشطة التوعية بكوفيد-19 في مخيم أشتي للنازحين داخلياً في السليمانية، منظمة الصحة العالمية في العراق

- أطلقت منظمة هيبي غير الحكومية، الشريك لمنظمة الصحة العالمية، مشروع صندوق التضامن التابع لمنظمة الصحة في محافظة السليمانية الذي يستهدف توعية المجتمع حول الوقاية من كوفيد-19- والتطعيم ضده في مخيم أشتي للنازحين داخلياً في المحافظة. وعقدت دورات تدريبية شملت 50 متطوعاً من ساكني المخيم حول الإبلاغ عن المخاطر بالإضافة إلى جلسات توعية مجتمعية منزلية يومية من المقرر أن تستمر حتى 15 يوليو/تموز 2021

- قام فريق منظمة الصحة العالمية في دهوك بزيارة إلى مخيم روانجا للنازحين داخلياً، أحد مخيمات النازحين الخمسة في محافظة دهوك التي استهدفها مشروع صندوق التضامن التابع لمنظمة الصحة العالمية من خلال إجراء تدريبات حول الإبلاغ عن المخاطر وحملة توعية للوقاية من كوفيد-19- والتطعيم ضده. ويُنفذ المشروع في المحافظة من قبل منظمة هيبي غير الحكومية، الشريك المحلي لمنظمة الصحة العالمية منذ 15 مايو/آيار 2021. وفي هذا السياق، عقدت جلسات توعية لسكان المخيمات المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم معدات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم، والمساعدة المباشرة في التسجيل للحصول على لقاح كوفيد-19 من خلال منصة وزارة الصحة.



صورة 3: زار فريق منظمة الصحة العالمية في دهوك مخيم روانجا للنازحين لمراقبة مشروع صندوق التضامن التابع لمنظمة الصحة العالمية وأنشطة التوعية ذات الصلة. منظمة الصحة العالمية في العراق

ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

المؤتمر الافتراضي الثالث بشأن "الوبائيات المعلوماتية"

**الاستجابة للوبائيات المعلوماتية
دعوة إلى العمل**

كن من الموقعين على الدعوة إلى العمل
أثرت وفرة المعلومات، بما في ذلك المعلومات
المغلوبة والمضللة، بشكل كبير على مجتمعاتنا،
ولا تزال تشكل تهديداً على صحتنا ورفاهيتنا.

انضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركائها في التعهد
بتحمل المسؤولية عن إدارة الوبائيات المعلوماتية.
وقّع دعوتنا إلى العمل لإظهار دعمك.

يرجى قراءة الدعوة إلى العمل والتوقيع عليها هنا:
<http://bit.ly/WHOmanifesto>
#societyvsinfodemic



World Health Organization | infodemic MANAGEMENT

- (1) إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه: (لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا)

**تدريب في الوقت الفعلي
حول كوفيد-19**

وحدات تعليمية مجانية عبر الإنترنت تقدمها منظمة الصحة العالمية

مقدمة إلى كوفيد-19
الصحة والسلامة
الرعاية السريرية
الوقاية من العدوى ومكافحتها

معدات الحماية
نظافة اليدين
مواضيع الوقاية الأخرى
قدرات البلدان
المرافق العلاجية
أداة البيانات الميدانية
التجمعات الجماهيرية

OpenWHO.org

- (2) التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على OpenWHO.org.

4. المتطلبات والاحتياجات العاجلة

- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19- مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- التردد المتواصل في أخذ لقاح استرازينكا بين أفراد المجتمع، خاصة النساء، يؤثر على جهود برنامج التطعيم.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لاستدامة التدخلات بشأن كوفيد-19 ودعمها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

- زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة تعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.
- الإدارة السليمة والكشف عن سلالة دلتا من كوفيد-19 من خلال المراقبة الصارمة للحدود وتتبع المخالطين بعناية.
- إنشاء خطوط ساخنة للمرضى الخاضعين للعزل المنزلي، بالإضافة إلى الإبلاغ عن مواقع التطعيم وأنواع اللقاحات المتاحة قدر الإمكان.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية مثل فطار الغشاء المخاطي (الفطر الأسود) وغيرها من حالات الاعتلال المشترك. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية / الشركاء

أبلغت منظمة فيان غير الحكومية، بالتعاون مع منظمة كادوس غير الحكومية، المجموعة الصحية بخطتها المتمثلة في البدء بتنفيذ مشروع مدته 10 أشهر حول "تنمية القدرات على الممارسات الموحدة للوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى ابن سينا للحد من انتشار العدوى الثانوية بين المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية ووقف انتقال العدوى الممكن تجنبها في نينوى". ويهدف المشروع، المفترض أن يبدأ في 1 يونيو/حزيران من هذا العام، إلى تدريب العاملين الصحيين على الممارسات الصحية المتعلقة بنظافة اليدين، والوقاية من العدوى في مواضع الجراحة، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وممارسات سلامة الحقن، والممارسات المتعلقة بالوقاية من التهابات المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة. وتشكل تدابير الوقاية من عدوى كوفيد-19 - ومكافحتها وحدة تعليمية مشمولة في حزمة تدريب العاملين الصحيين على التطعيم ضد كوفيد-19.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

1. السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int
2. د. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: sabaratanamv@who.int
3. السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: +96477729877288، البريد الإلكتروني: ajellopa@who.int