

المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية
في العراق

مرض فيروس كورونا
(كوفيد-19)

تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 21)
من 24 مايو/أيار إلى 30 مايو/أيار 2021

عدد الوفيات



16,351

عدد حالات الشفاء



1,111,466

عدد الحالات المؤكدة



1,197,082

عدد الحالات النشطة



69,265

عدد الفحوص



10,403,611


النقاط الرئيسية

1. في الأسبوع 21، أبلغت وزارة الصحة عن 29,142 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بمعدل بلغ 70.7 حالة/ لكل 100,000 شخص. بلغ عدد الوفيات الجديدة المتصلة بالمرض المبلغ عنها هذا الأسبوع 161 حالة وفاة، ما يشير إلى معدل وفيات 0.6%.
2. حتى تاريخ 30 مايو 2021، تم إعطاء إجمالي 525,507 *جرعة لقاح في جميع أنحاء العراق، ما يشير إلى أن 2.27% من السكان المستهدفين قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.
3. في الأسبوع 21، واصلت محافظتا بغداد والبصرة تسجيل أعلى مستوى إبلاغ عن المرض، فيما سجلت محافظات الأنبار والمثنى ونيوى وصلاح الدين مستوى إبلاغ متوسط.
4. انتشرت العدوى المجتمعية بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية.
5. زار الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، دائرة صحة السليمانية لتدشين التسليم الرسمي لشحنة من المستلزمات والتكنولوجيات الطبية التي ضمت معدات خاصة بالمستشفيات ومعدات مخبرية بالإضافة إلى معدات الوقاية الشخصية. وسيتم توجيه هذه المستلزمات إلى المرافق الصحية في مناطق رانية وحلبجة وغرميان لدعم عمليات الاستجابة لكوفيد-19- هناك. تم تمويل الشحنة من قبل الجهات المتبرعة التالية: مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID-BHA)، ومكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو)، وحكومة ألمانيا، ودولة وشعب الكويت.




1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 21، (24 مايو/آيار إلى 30 مايو/آيار 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع 29,142 حالة، ما يشير إلى زيادة طفيفة تبلغ 575 حالة مقارنة بالأسبوع 21 حيث تم الإبلاغ عن 28,567 حالة.




الشكل 1: المنحنى الوبائي لمرض كوفيد-19 في العراق في الأسبوع 21

- ارتفع إجمالي فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع 21 بمقدار 33,668 فحص، ليصل إلى 282,203 فحص، ما يمثل 6,851 فحص لكل 1 مليون من السكان. تشير الزيادة في عدد فحوص RT-PCR في الأسبوع 21 إلى تسارع في اكتشاف حالات الإصابة.




الشكل 2: فحوص RT-PCR في العراق حسب الأسبوع - الأسبوع 21، 2021

- بلغ معدل الإيجابية في الأسبوع (21) 10%، وهو أقل بنسبة 1% من المعدل المسجل في الأسبوع 20. المحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي ميسان بنسبة 21.4% وبغداد-الكرخ بنسبة 21.1%، وذي قار وواسط عند 18.7% و18.8% على التوالي. وسجلت أدنى نسبة في أربيل 3.7% وصلاح الدين 3.9%.



الشكل 3: معدل الإيجابية لكوفيد-19 حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 21، 2021

- بلغ عدد الوفيات المتصلة بكوفيد-19 التي تم الإبلاغ عنها هذا الأسبوع 161 حالة وفاة، وهو ما يمثل معدل إماتة 0.6%، وهو معدل لا يختلف كثيراً عن معدل الإماتة في الأسبوع 20 (0.8%). من ناحية أخرى، سجلت مستشفيات محافظة بغداد أعلى معدل إماتة حالات عند 2.5%، بينما سجلت مستشفيات البصرة والديوانية ودبالي المعدل الأدنى عند 0.1% لكل منها.



الشكل 4: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسبوع - الأسبوع 21، 2021

- بلغ متوسط عدد المرضى في المستشفيات في الأسبوع (21) 1599 مريضاً يومياً، مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ 1.4%. من ناحية أخرى، بلغ معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة لهذا الأسبوع 19%، ولم يلاحظ أي تغيير كبير مقارنة بالأسابيع السابقة.
- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية الأعلى من 15-45 سنة والفئة العمرية الأعلى من 45-65 سنة بمعدل 57% و29% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد تم تسجيل أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) و(أعلى من 65 سنة) بمعدل 38% و51% على التوالي.
- ويشير التوزيع الجنساني إلى معدل حالات إصابة 57% ومعدل وفيات 62% بين الذكور.

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 21:

خلال الأسبوع 21، انتشرت العدوى المجتمعية بشكل كبير في العراق وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإصابة. وسجلت المستويات الأعلى في بغداد والبصرة، فيما سجلت المستويات الأدنى في الأنبار وبابل.

المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإصابة	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإصابة	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	19	1	5	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
بابل	37	4	6	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
بغداد	103	6	14	عالية	متوسطة	شديدة	4	2	3	9	شديدة
البصرة	145	2	13	عالية	منخفضة	شديدة	4	1	3	8	شديدة
الديوانية	54	1	15	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
ديالى	67	1	12	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
كربلاء	63	3	17	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
كركوك	52	4	10	شديدة	منخفضة	متوسطة	3	1	2	6	متوسطة
كردستان	70	8	6	شديدة	متوسطة	متوسطة	3	2	2	7	شديدة
ميسان	98	3	21	شديدة	منخفضة	عالية	3	1	4	8	شديدة
المثنى	28	2	12	متوسطة	منخفضة	شديدة	2	1	3	6	متوسطة
النجف	85	5	14	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة
نينوى	30	1	5	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
صلاح الدين	33	2	4	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	1	4	متوسطة
ذي قار	37	2	18	متوسطة	منخفضة	شديدة	2	1	3	6	متوسطة
واسط	88	3	19	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة
العراق	71	4	10	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	7	شديدة

الشكل 5: العدوى المجتمعية وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية (الإصابات والوفيات ومعدل الإصابة)


3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

أ- حملة التطعيم ضد كوفيد-19:


- حتى تاريخ 30 مايو/أيار 2021، تم إعطاء إجمالي 525,507 *جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 2.27% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. ومن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح، تلقى 409,832 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 115,675 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- في الأسبوع 21، كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح أن 267,410 (68%) من الذكور قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 124,188 (31%) من الإناث. فيما تلقى 76,193 (64%) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 42,053 (36%) من الإناث. وقد تكون أسباب انخفاض الإقبال بين النساء مرتبطة ببقاء معظم الإناث في المنزل لرعاية أسرهن، إلى جانب الشائعات حول الآثار الجانبية للقاحات.

- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 153,736 (40%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 229,042 (60%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.

- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى من اللقاح بغداد- الكرخ 78,562 (3.8%)، تليها النجف (2.8%)، والديوانية (2.4%)، وكرلاء (2.1%)، والبصرة وكركوك كلاهما (1.9%). سجلت ميسان النسبة الأقل من التطعيم بين السكان في المحافظات خلال الأسبوع 21 بمعدل (0.6%)، فيما سجلت السليمانية معدل (0.96%)، واسط ونينوى (1.0%).



الشكل 6: التطعيم اليومي باللقاح ضد كوفيد-19



الشكل 7: التطعيم في العراق حسب اللقاح/المحافظة - الأسبوع 21، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 525,507* جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

ب- تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



حملة التطعيم في كركوك التي تجريها منظمة (داما)،
الشريك المنفذ لمنظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة
العالمية، العراق

- أطلقت منظمة أطباء مساعدون للنشاطات الطبية (داما)، الشريك المنفذ لمنظمة الصحة العالمية، حملة تطعيم ضد كوفيد-19 في مديريات الحويجة والديس وداقوق في محافظة كركوك لمعالجة التردد في أخذ اللقاح بين النازحين العائدين في هذه المديريات. وحتى تاريخ 30 مايو/آيار، تم الوصول إلى حوالي 830 فرداً لتعريفهم بأهمية اللقاحات ضد كوفيد-19



عملية اعطاء اللقاح في مخيمات النازحين واللاجئين
في أربيل. منظمة الصحة العالمية في العراق

- تستمر حملات تطعيم النازحين واللاجئين في مخيمات أربيل بدعم من المنطمتين غير الحكوميتين: الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة بارزاني الخيرية. وتم تقديم أكثر من 7049 جرعة للمستفيدين في مخيمات قوشتبه، وديبكة، والخازر، وحسن شام U3، وحسن شام U2.



دورة تدريب المدربين التي قامت بها منظمة الصحة العالمية بشأن خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. البصرة-منظمة الصحة العالمية في العراق

- نظمت منظمة الصحة العالمية في العراق دورة تدريبية لمدة 4 أيام لمدرربي مقدمي الرعاية الصحية العاملين في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي من دوائر الصحة في البصرة والمثنى وميسان وذي قار وبغداد والديوانية. وكان الهدف من التدريب تعزيز قدرات الدوائر المذكورة وغيرها من المرافق الصحية ذات الصلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة بما في ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي أثناء جائحة كوفيد-19 وبعدها.



فريق منظمة الصحة العالمية في دهوك أثناء زيارة مراقبة إلى مخيم شاريا للنازحين داخلياً، دهوك - إقليم كردستان. منظمة الصحة العالمية في العراق

- زار فريق منظمة الصحة العالمية في دهوك مخيمي شاريا وكبرتو 2 للنازحين لمراقبة تنفيذ حملة التوعية الحالية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية والتدريب حول الإبلاغ عن المخاطر في المخيمات المذكورين. وتنفذ سبعة فرق هذه الحملة التي تستهدف أسر النازحين داخلياً، حيث يزودونهم بمعلومات حول ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا والتدابير الوقائية والسيطرة على العدوى.

ت- الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

المؤتمر الافتراضي الثالث بشأن "الوبائيات المعلوماتية"

**الاستجابة للوبائيات المعلوماتية
دعوة إلى العمل**

كن من الموقعين على الدعوة إلى العمل
أثرت وفرة المعلومات، بما في ذلك المعلومات
المغلوبة والمضللة، بشكل كبير على مجتمعاتنا،
ولا تزال تشكل تهديداً على صحتنا ورفاهيتنا.

انضم إلى منظمة الصحة العالمية وشركائها في التعهد
بتحمل المسؤولية عن إدارة الوبائيات المعلوماتية.
وقّع دعوتنا إلى العمل لإظهار دعمك.

يرجى قراءة الدعوة إلى العمل والتوقيع عليها هنا:
<http://bit.ly/WHOmanifesto>
#societyvsinfodemic



World Health Organization | infodemic MANAGEMENT

- (1) إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه: (لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا)

**تدريب في الوقت الفعلي
حول كوفيد-19**

وحدات تعليمية مجانية عبر الإنترنت تقدمها منظمة الصحة العالمية

مقدمة إلى كوفيد-19
الرعاية السريرية
الصحة والسلامة
الوقاية من العدوى ومكافحتها

معدات الحماية
نظافة اليدين
مواضيع الوقاية الأخرى
قدرات البلدان
المرافق العلاجية
أداة البيانات الميدانية
التجمعات الجماهيرية

OpenWHO.org

- (2) التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على OpenWHO.org.

4. المتطلبات والاحتياجات العاجلة

- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالي الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- ما يزال التردد في أخذ لقاح استرازينكا بين أفراد المجتمع، خاصة النساء، يؤثر على جهود برنامج التطعيم.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لاستدامة التدخلات بشأن كوفيد-19 ودعمها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

- زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة تعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والمشاركة الإعلامية لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات الوقاية من كوفيد-19.
- الإدارة السليمة والكشف عن سلالة دلتا من كوفيد-19 من خلال المراقبة الصارمة للحدود وتتبع المخالطين بعناية.
- إنشاء خطوط ساخنة للمرضى الخاضعين للعزل المنزلي، بالإضافة إلى الإبلاغ عن مواقع التطعيم وأنواع اللقاحات المتاحة قدر الإمكان.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد البوابة، ومحاولة سد الثغرات.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لانتشار الموجة الثالثة من الجائحة والمتوقعة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية / الشركاء

1. بالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بحملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، قامت مجموعة الصحة بإدراج 4 مؤشرات في منصة التقارير التي تحدد الخدمات والإمدادات التي يقدمها شركاء مجموعة الصحة إلى وزارة الصحة/مديرية الصحة للاستجابة لجائحة كوفيد-19. وتم تغيير **لوحة معلومات كوفيد-19** الخاصة بمجموعة الصحة في العراق لتصبح لوحة معلومات حيوية وتفاعلية، يتم تحديثها تلقائياً بمجرد إرسال الشركاء تقاريرهم، وذلك بعد أن كانت لوحات معلومات شهرية ثابتة عند بداية انتشار الجائحة.
2. أبلغت الهيئة الطبية الدولية في العراق، أحد شركاء مجموعة الصحة، المجموعة عن تلقي تمويل لإجراء استبيان حول التردد في أخذ لقاح كوفيد-19 داخل مخيمات اللاجئين في إقليم كردستان العراق (دوميز 1، ودوميز 2، ودارشكران، وكوركوسك) ومخيم الخازر للنازحين. يهدف الاستبيان إلى:
 - أ. مساعدة الهيئة الطبية الدولية (IMC) في إطلاق حملة توعوية للتصدي لموضوع التردد في أخذ اللقاح في المخيمات.
 - ب. المساهمة في إجراء دراسة أكبر حول التردد في أخذ اللقاح في العراق والعالم.
3. أجرى الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة بارزاني الخيرية حملة تطعيم ضد كوفيد-19 في مخيم الخازر وحسن شام. كما شملت حملة التطعيم التي استمرت يومين (28 و29 مايو/أيار) مخيمات النازحين حيث استهدفت النازحين والعاملين في المجال الطبي والمنظمات غير الحكومية وأفراد الأمن في المخيمات.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

1. السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات في منظمة الصحة العالمية، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int
2. د. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: sabaratanamv@who.int
3. السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية، رقم الجوال: +96477729877288، البريد الإلكتروني: ajellopa@who.int