



عدد الوفيات



16,885

عدد حالات الشفاء



1,200,103

عدد الحالات المؤكدة



1,287,465

عدد الحالات النشطة



70,477

عدد انفحوص



11,269,612


## النقاط الرئيسية:

1. في الأسبوع 24، أظهر المنحنى الوبائي لكوفيد-19 ارتفاعاً جديداً في عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات ذات الصلة بالفيروس. وقد أبلغت وزارة الصحة عن إجمالي 32,822 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالأسبوع 23. وبلغ عدد الوفيات الجديدة المتصلة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 180 حالة وفاة، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالأسبوع السابق.
2. سجلت المحافظات الجنوبية أعلى نسبة إبلاغ عن حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسبوع 24، وهي الديوانية وميسان وذي قار وواسط حيث بلغ معدل الإيجابية الإجمالي 11% على مستوى البلاد.
3. لا تزال العدوى المجتمعية منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، ما ينذر بارتفاع محتمل في معدلات الإصابة.
4. حتى تاريخ 20 يونيو/حزيران 2021، تم إعطاء إجمالي \*825,051 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن 3.57% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
5. كشفت بيانات التلقيح حتى الآن، عن إعطاء 396,993 جرعة من لقاح استرازينيكا، و234,400 جرعة من لقاح فايزر، و193,658 من لقاح سينوفارم الصيني.




## 1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 24، (14-20 يونيو/حزيران 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 32,822، ما يمثل زيادة قدرها 3171 حالة مقارنة بالأسبوع 23 (زيادة بنسبة 10%).




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 24، 2021

- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (24) 299,484 فحصاً، ما يعكس زيادة قدرها 8,686 فحصاً مقارنة بالأسبوع 23، بمعدل 7271 فحصاً لكل مليون من السكان.




الشكل 2: فحوص RT-PCR في العراق في الأسبوع 24، 2021

- ارتفع معدل الإيجابية في الأسبوع 24 إلى 11% بعد استقراره في الأسابيع الثلاثة الماضية عند 10%. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي ذي قار 27% وميسان 23% وواسط 22% والديوانية 21%. بالمقابل، تم تسجيل أدنى معدل في الأنبار 2%، وصلاح الدين 3%، ونينوى 4%.



الشكل 3: معدل الإيجابية لكوفيد-19 حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 24، 2021

- بلغ عدد حالات الوفاة المتصلة بالمرض هذا الأسبوع 180 حالة، ما يمثل زيادة قدرها 13 حالة وفاة مقارنة بالأسبوع الماضي. أما معدل إماتة الحالات فقد بلغ 0.5%، وهو لا يمثل فرقاً كبيراً عن معدل إماتة الحالات المُبلغ عنها في الأسابيع السابقة.



الشكل 4: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في العراق (الأسبوع 24، 2021)



- بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (24) 1871 مريضاً في اليوم، مع معدل امانة في المستشفيات بلغ 1.4%. بقي معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة لهذا الأسبوع عند 19% أي دون تغيير كبير مقارنة بالأسابيع الماضية.

COVID-19 Data Interpretation 2021, Mean of Previous weeks , Versus Current Week		
Variable Name	Mean	WK 23
RT-PCR tests	275,801	299,484 ↑
Test Per 1 Million	6,664	7,271 ↑
confirmed COVID-19 Cases	28,559	32,822 ↑
Case Per 100 THs	69.3	79.7 ↑
Positivity Rate	10.3 %	11 % ↑
Case Fatality Rate	0.7 %	0.5 % ↓
Hospitalization (In Patient)	1,954 Per Day	1871 Per Day ↓
Death	168 Per Week	180 ↓
HFR	1.2	1.4%
% of ICU among In Patient	19 %	19 %
% on Ventilator	22 %	19 %

جدول 1: تفصيل بيانات المرض في الأسبوع 24، 2021. متوسط الأسابيع الماضية مقارنة بالأسبوع الحالي

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة)، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 59% و 26% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) و (الأعلى من 65 سنة)، بمعدل 38% و 52% على التوالي.

- يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث في الأسبوع 24 إلى 1.5 و 1.6 على التوالي.



الشكل 5: التوزيع الجنساني لحالات الإصابة/الوفيات بكوفيد-19 في الأسبوع 24، 2021

ملاحظة: (تشير القيمة 0\* في الشكل 5، المخطط الدائري الأيسر، إلى عدد الوفيات الفعلي البالغ 11 وفاة)

## 2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 24:

خلال الأسبوع 24، انتشرت العدوى المجتمعية بشكل كبير في العراق وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية. وسجلت المستويات الأعلى في ذي قار وواسط والبصرة وبغداد والنجف، فيما سجلت المستويات الأدنى في صلاح الدين والأنبار.

المحافظات	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	14	1	2	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	4	متوسطة	
بابل	61	1	3	شديدة	منخفضة	متوسطة	3	1	2	متوسطة	
بغداد	115	6	4	عالية	متوسطة	شديدة	4	2	3	عالية	
البصرة	163	4	4	عالية	منخفضة	شديدة	4	1	3	عالية	
الديوانية	77	0	3	شديدة	منخفضة	عالية	3	1	4	عالية	
ديالى	61	1	3	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	عالية	
كربلاء	78	2	3	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	عالية	
كركوك	49	10	2	متوسطة	متوسطة	متوسطة	2	2	2	متوسطة	
كردستان	56	9	3	شديدة	متوسطة	متوسطة	3	2	2	عالية	
ميسان	98	4	3	شديدة	منخفضة	عالية	3	1	4	عالية	
العتش	25	2	2	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	متوسطة	
النجف	106	3	4	عالية	منخفضة	شديدة	4	1	3	عالية	
نينوى	24	1	2	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	1	متوسطة	
صلاح الدين	11	2	2	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	1	متوسطة	
ذي قار	101	9	4	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	عالية	
واسط	146	0	4	عالية	منخفضة	عالية	4	1	4	عالية	
العراق	80	4	3	شديدة	منخفضة	شديدة	3	1	3	عالية	


جدول 2: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 24، 2021

## 3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:


### أ) حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى تاريخ 20 يونيو/حزيران 2021، تم إعطاء ما مجموعه 825,051\* جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 3.57% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19. ومن إجمالي عدد الحاصلين على اللقاح، تلقى 586,236 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 238,815 شخصاً تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- في الأسبوع 24، كشفت إحصاءات إدارة اللقاح أن 370,971 (67%) من الذكور تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 181,313 (33%) من الإناث، بينما تلقى 168,838 (64%) من الذكور الجرعة الثانية مقابل 94,445 (36%) من الإناث. وما يزال الاقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم إلى أن 238,815 (29%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 586,236 (71%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.


- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد-الكرخ مع 105.597 (5.1%)، تليها النجف (3.7%)، والبصرة (3.0%)، والديوانية (2.9%)، وكر بلاء (2.8%)، وكر كوك (2.7%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 24 في ميسان والسليمانية بمعدل (1.1%) لكل منهما، وبنينوى (1.5%) وواسط (1.6%).



الشكل 6: توزيع الحكومة للقاحات ضد كوفيد-19 بحسب نوع اللقاح



الشكل 7: التطعيم بحسب نوع اللقاح



الشكل 8: بيانات التطعيم اليومي ضد كوفيد-19، الأسبوع 24، 2021

**ملاحظة:** وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 825,051\* جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

## ب) تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



صورة 1: فريق منظمة الصحة العالمية في العراق يزور مستشفى الحويجة بركوك، يونيو/حزيران 2021. الصورة: منظمة الصحة العالمية في العراق

- نفذ الفريق الفني التابع لمنظمة الصحة العالمية في العراق مهمة مراقبة في مستشفى الحويجة الذي يقدم خدماته إلى مجموعة كبيرة من العائدين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وركزت المهمة على تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنطقة والاحتياجات والفجوات الصحية التي تعترض الطريق أمام جهود الاستجابة لكوفيد-19 في المنطقة.

- في إطار نشاطات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية في محافظة دهوك في إقليم كردستان - العراق، زار الفريق الفني التابع لمنظمة الصحة العالمية في العراق مخيم مام راشان للنازحين داخلياً حيث تجري منظمة هيئي المحلية غير الحكومية حالياً نشاطات بشأن الإبلاغ عن المخاطر. وحضر القاطنون في المخيم جلسات توعية حول كوفيد-19، وتم تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية ومواد الإعلام والتعليم والإبلاغ التي توضح أهمية التطعيم وتدابير الوقاية من كوفيد-19. كما رصدت الزيارة كذلك عملية تسجيل النازحين في منصة التسجيل الإلكتروني بوزارة الصحة للحصول على التطعيم.



صورة 2: فريق منظمة الصحة العالمية في العراق يجري زيارة تفقدية لمخيم مام راشان للنازحين داخلياً في دهوك في إطار نشاطات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، يونيو/حزيران 2021. الصورة: منظمة الصحة العالمية في العراق

## ج) الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:



(1) إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه:  
**(لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا)**



(2) التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على [.OpenWHO.org](https://openwho.org).

#### 4. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

#### 5. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالة (سلالات) دلتا المتحورة من كوفيد-19 مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- التردد المتواصل في أخذ لقاح استرازينكا بشكل خاص بين أفراد المجتمع يؤثر على جهود برنامج التطعيم.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية طرح التطعيم.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لاستدامة التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

#### 6. التوصيات

- توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:
- تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم الإعلان عنها بشكل جيد في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وإنشاء خط (خطوط) ساخنة لخدمات التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
  - ✓ إعادة تفعيل الإغلاق الجزئي الذي يستهدف ساعات العمل في مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية.
  - ✓ اغتنام اقتراب موسم الحج القادم لدعوة الفئات العمرية الكبيرة المؤهلة التي يخطط أصحابها للذهاب للحج و/ أو العمرة، لتسريع عملية التسجيل لأخذ لقاحاتهم.

- ✓ حث المصابين بأمراض مزمنة على التطعيم، والاستفادة من بطاقات الأدوية السنوية التي يحملها هؤلاء الأشخاص وزيارتهم الشهرية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة لهم للحصول على حصتهم من الأدوية المدعومة. يمكن تزويد مراكز الرعاية الصحية الأولية بكميات من اللقاحات لتنفيذ الإجراء المقترح.
- ✓ إشراك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تنظيم عملية تسجيل اللقاح وطرحه بالإضافة إلى مهمة مراقبة التزام العامة بتدابير الوقاية التي تصدرها وزارة الصحة.
- ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توافر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
- ✓ الاستثمار في الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة في المناطق النائية أو مخيمات النازحين، وإنشاء مراكز تطعيم مسائية في الأماكن العامة. فقد يؤدي هذا إلى زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتسجيل للحصول على التطعيم.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- الإدارة السليمة والكشف عن سلالة (سلالات) دلتا من كوفيد-19 من خلال المراقبة الصارمة للحدود وتتبع المخالطين بعناية.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

## 7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

1. تعمل منظمة انترنيوز عبر منصتها الإعلامية على إطلاق مشروع "Rooted in Trust" الذي يهدف إلى جمع المعلومات الخاطئة حول كوفيد-19 في العراق وتحليلها والاستجابة لها بالتنسيق مع مجموعة الصحة وغيرها من الوكالات الشريكة للأمم المتحدة هنا. ويتضمن المشروع المقرر إطلاقه قريباً عدة أنشطة مثل:
  - ✓ تقييم النظام التكنولوجي للمعلومات بما في ذلك استكشاف ديناميات الثقة في مصادر المعلومات ومقدميها.
  - ✓ أنشطة جمع الشائعات حول كوفيد-19 والمشاركة فيها عبر الإنترنت وخارجها.
  - ✓ نشرات تحليل الشائعات، والتقارير، والموارد الأخرى لشبكات الاتصال للشؤون الإنسانية.
  - ✓ دعم وسائل الإعلام المحلية لتحسين استجابتها للجائحة.
- وقد زود شركاء المجموعة الصحية ومجموعة العمل الخاصة بحملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية المنظمة المسؤولة عن المشروع بالمعلومات اللازمة لتسهيل إطلاقه.
- 2- شاركت مجموعة العمل الخاصة بحملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية شركاء المجموعة الصحية بقائمة من المقاطع الصوتية القصيرة التي ستبث عبر الراديو من خلال 10 قنوات إذاعية في الدولة خلال أوقات محددة في الصباح والمساء. وستركز الرسائل على حملة التطعيم ضد كوفيد-19 وتصحيح المعلومات الخاطئة. وستقوم المؤسسات الإعلامية بتتبع الرسائل التي تُذاع على الراديو، والاستماع إلى التعليقات بشأنها وجمع التغذية الراجعة حولها لتقييم تأثير هذه المقاطع.

وستستمر الحملة الإذاعية عبر الراديو حتى 17 يوليو/تموز 2021. وتمت مشاركة هذه القائمة مع شركاء المجموعة الصحية للحصول على المعلومات ونشرها على نطاق واسع.

3- في اجتماع فرقة العمل الخاصة بكوفيد-19 التابعة لمجموعة الصحة العراقية المنعقد بتاريخ 17 يونيو/حزيران، قدمت المنظمة الدولية للهجرة عرضاً تقديمياً حول عمليات فحص وفرز الإصابات بالفيروس أثناء تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للسكان المتضررين. وينصب تركيز المنظمة الدولية للهجرة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وحملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، ومراقبة المرض، وإدارة كوفيد-19، والفحص عند نقاط الدخول. تم تشغيل نظام فحص وفرز الحالات في 30 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في 6 محافظات من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى مايو/أيار 2021. وعلى الرغم من ضعف التمويل الخاص بكوفيد-19، ستواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم خدمات الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث تكون المزود الأساسي للخدمات الصحية.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)

د. فيكي ساباراتنام، مسؤول فني، الصحة العامة، هاتف: +9647729877244، بريد إلكتروني: [sabaratnamv@who.in](mailto:sabaratnamv@who.in)

السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال، هاتف: +96477729877288، البريد الإلكتروني: [ajellopa@who.int](mailto:ajellopa@who.int)