



عدد الوفيات



23,344

عدد حالات الشفاء



2,014,862

عدد الحالات المؤكدة



2,062,863

عدد الحالات النشطة




24,657

عدد الفحوص




15,937,990

الحالة الوبائية للمرض في العراق في الأسبوع 44:




- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 7,615، ما يمثل انخفاضاً قدره 1,359 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، بمعدل 18 حالة لكل 100 ألف من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (-18%). وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض هذا الأسبوع 174 حالة، مع معدل إماتة 2.3%.



- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR هذا الأسبوع 125,232 فحصاً، ما يشير إلى انخفاض الفحوص بمقدار 10,617 فحصاً مقارنة بالأسبوع 43. ويمثل هذا 3,040 فحصاً لكل 1 مليون من السكان، وتغيراً بنسبة (-8%).



- بلغ معدل الإيجابية 6% في الأسبوع 44. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي السليمانية 12% ودهوك وكوكوك 11%. بالمقابل، تم تسجيل أدنى معدل في بابل 0.9% وكرבלاء 1.9%.



- بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات هذا الأسبوع 561 مريضاً يومياً، 27% منهم في حالة خطيرة، و31% تتم معالجتهم في وحدة العناية المركزة، و71% تقريباً بحاجة إلى الأكسجين. وبلغ معدل الإماتة في المستشفيات هذا الأسبوع 4.4%.

ملاحظات للقراء:

- مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هنا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.

- يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SINwkk>

المؤشرات الوبائية للمرض في الأسبوع 44:

كانت حالة العدوى المجتمعية الإجمالية في البلاد "متوسطة" هذا الأسبوع، باستثناء محافظة كركوك، ومحافظة السليمانية واربيل ودهوك في إقليم كردستان، والتي استقرت في المنطقة "شديدة" الخطورة بمجموع 7 نقاط لكركوك و8 نقاط لمحافظة الإقليم. فيما وصلت الأنبار وبابل وبغداد استقرارها في المنطقة الخضراء "منخفضة" الخطورة عند 3 لكل منها، وذلك وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية.


المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وفاء بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاء بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	3.8	0	5	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
بابل	1.9	0	0.9	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
بغداد	9.6	1.5	3.1	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
البصرة	8	1.6	3.5	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
الديوانية	4.6	0	2.6	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
ديالى	11.1	2.8	10.5	متوسطة	منخفضة	شديدة	2	1	3	6	متوسطة
كربلاء	3.4	1.5	1.9	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
كركوك	22.8	8.1	10.7	متوسطة	متوسطة	شديدة	2	2	3	7	شديدة
كردستان	72.5	19.2	9.3	شديدة	شديدة	متوسطة	3	3	2	8	شديدة
ميسان	3.6	0	3.6	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
المتن	3.8	0	2	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
النجف	10.6	0.6	3	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	1	4	متوسطة
نينوى	18.1	3.2	8.3	متوسطة	متوسطة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
صلاح الدين	23.3	4.1	5.8	متوسطة	متوسطة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
ذي قار	2.7	0.4	3.7	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
واسط	7.5	2	3.2	منخفضة	منخفضة	منخفضة	1	1	1	3	منخفضة
العراق	18.5	4.2	6.1	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة

جول 1: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 44، 2021


تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

1. بدء التطعيم ضد كوفيد-19 والإقبال عليه:

- حتى تاريخ 08 نوفمبر/تشرين الأول 2021، تم إعطاء إجمالي *10,136,121 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 6,353,607 من السكان في العراق (15.4%) قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 3,782,514 (9.2%) تحصيماً كاملاً.
- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 44 أن 3,939,236 (62%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 2,414,371 (38%) من الإناث. فيما حصل 2,382,984 (63%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل 1,399,530 (37%) من الإناث. وما يزال الإقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 1,922,071 (19%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 8,214,050 (81%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.
- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى من اللقاح بغداد - الكرخ 809,384 (37.9%)، تليها البصرة (35.1%)، والنجف (31.9%)، وديالى (31.5%)، ودهوك (30.9%)، وصلاح الدين (30.2%)، وكربلاء (28.2%)، وكركوك (26.7%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 44 في ميسان (17.7%)، والسليمانية (18.0%)، والموثني (19.3%).



الشكل 1: التطعيم في العراق حسب الشهر - 2021



الشكل 2: التطعيم في العراق حسب نوع اللقاح - الأسبوع 44، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق *10,136,121 جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

2. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء: (الأسبوع 44)

- أطلقت منظمة الصحة العالمية في العراق بالاشتراك مع وزارة الصحة حملة تلقيح واسعة ضد كوفيد-19 استهدفت نحو 12 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. وتسعى الحملة إلى تطعيم 40% من السكان في العراق بحلول نهاية 2021. ووفقاً لتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين الموسع في العراق ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ستغطي حملة التطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق.



صورة 1: ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق مع طفل يحصل على التطعيم خلال حملة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة للتطعيم ضد كوفيد-19، إبريل-العراق في 6 نوفمبر/تشرين الأول 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق

- حتى تاريخ 7 نوفمبر/تشرين الأول 2021، أجرى منسق فريق العمل أربع مهمات تقييم لمرافق صحية في مخيمات النازحين داخلياً في محافظات نينوى وإربيل ودهوك والسليمانية. واختيرت المرافق بناء على عدد سكانها لمراقبة ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها واستشفاف المشاكل وواجه القصور ذات الصلة التي تتطلب التحسين. وتناولت الأداة المستخدمة في التقييم كلاً من النقاط التالية: القدرة الفنية، والإبلاغ، وآلية الإحالة، والإمدادات، والفرز/إدارة الحالات المشتبه بإصابتها، والتدريب، ومراقبة العاملين الصحيين، وإدارة النفايات.



صورة 2: منسق فريق عمل المجموعة في مهمة تقييم لمجتمعات المضيفة في مخيمات النازحين داخلياً، نوفمبر/تشرين الثاني 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق

وعُرضت نتائج المهمة في اجتماع فريق العمل المعني بكوفيد-19 وتمت على إثر ذلك مشاركة التوصيات الواردة أدناه مع الشركاء:

- أهمية التحديد المبكر للمرضى المشتبه بإصابتهم بالمرض وفصلهم عن الآخرين عند الفرز لمنع انتقال العدوى في مرافق الرعاية الصحية.
- إعداد استبيان للاستخدام يتضمن أسئلة من شأنها تحديد ما إذا كان المريض يستوفي الشروط المعروفة لحالات كوفيد-19 أم لا.
- إعداد منطقة انتظار منفصلة للمرضى المشتبه بإصابتهم بالمرض.
- تركيب حواجز مادية (على سبيل المثال، شاشات زجاجية أو بلاستيكية) لمكتب التسجيل (أي منطقة الاستقبال) والحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي لا تقل عن متر واحد للحد من الاتصال الوثيق بين موظفي المكتب والمرضى المشتبه بإصابتهم بالمرض.
- إنشاء خط ساخن يمكن للمرضى الاتصال به أو إرسال رسائل نصية إليه لإخطار المرفق برغبتهم بالحصول على الرعاية بسبب ظهور أعراض الإصابة بالمرض لديهم.

الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- المعالجة الفورية للإقبال المنخفض نسبياً على اللقاح لا سيما في المناطق الفقيرة والريفية والنائية والضواحي، لتحقيق نسبة تطعيم تعادل 40% في جميع أنحاء البلاد بنهاية 2021.
- تستلزم المؤشرات الوبائية في العراق التأكيد المستمر على أهمية الوقاية وارتداء الكمامات والتطعيم في جميع أنحاء البلاد.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

التوصيات

- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
 - ✓ إنشاء مواقع تطعيم خارجية لتسريع عملية إعطاء اللقاح.
 - ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي مع التركيز على التطعيم، وارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

- السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int
- د. عاكف ساتشيوغلو، منسق برنامج التحصين، هاتف: +9647827886758، بريد إلكتروني: saatcioglu@who.int
- د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة، هاتف: +9647729814999، بريد إلكتروني: hatahitw@who.int